

Przygotowanie do operacji powiek górnych i /lub dolnych

Prosimy zabrać następujące dokumenty:

Dowód Osobisty.

Zalecana opinia od lekarza ogólnego (pierwszego kontaktu, internisty), że u Pacjenta nie stwierdzono przeciwwskazań do zabiegu w znieczuleniu miejscowym.

Chory zabiera ze sobą wszystkie swoje leki w oryginalnych opakowaniach oraz zalecenia dotyczące ich dawkowania.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa przeprowadzanego zabiegu operacyjnego należy przestrzegać poniższych zasad.

- Dzień przed operacją należy starannie umyć całe ciało, twarz oraz włosy.
- Dzień przed operacją nie wolno stosować żadnych kremów na noc!
- W dniu operacji należy umyć twarz wodą i mydłem.
- W dniu operacji nie wolno stosować kremów, tuszu do rzęs, fluidu ani żadnych innych kosmetyków!

WAŻNE!!!

W dniu zabiegu operacyjnego i do dwóch tygodni po operacji nie wolno stosować tuszu do rzęs, fluidu.



Trzy- cztery dni przed operacją nie wolno przyjmować leków zmniejszających krzepliwość krwi: Acard, Polopiryna, Aspiryna, Polocard, Xarelto, Warfin i innych, zawierających kwas salicylowy. W przypadku przewlekłego stosowania pochodnych acenokumarolu (Sycumar, Sintrom) pacjenci powinni mieć podaną zastępczo heparynę. W tym celu należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

PACJENCI OPEROWANI W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM NIE MUSZĄ BYĆ NA CZCZO.

Zalecenia pooperacyjne

Po przebytej operacji, prosimy ściśle stosować się do zaleceń lekarza operującego. W przypadku pogorszenia widzenia lub pojawienia się znacznych dolegliwości bólowych lub innych niepokojących objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem operującym.

- Należy unikać pochylania się i napinania mięśni brzucha. W okresie pooperacyjnym należy wstrzymać się od uprawiania sportu.

- Nie należy podnosić ciężkich przedmiotów.
- Nie należy uciskać operowanego oka i nie trzeć go. Należy zachować ostrożność przy myciu twarzy. Ewentualną wydzielinę należy usuwać czystym, wilgotnym (zmoconym w ciepłej przegotowanej wodzie) gazikiem, unikając uciskania powiek, szczególnie powieki górnej.
- Należy przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania kropli.
- Dokładnie myć ręce przed zakraplaniem.