


Jak należy stosować krople do oczu

Aby zapewnić jak największą skuteczność i bezpieczeństwo podawanych leków do oczu, należy stosować się do kilku zasad:

Jeśli buteleczka posiada „kołnierzyk”, koniecznie usuń go, aby w czasie podawania kropli nie spadł i nie uszkodził oka.



Krople wkraplaj w części skroniowej dolnego załamka spojówkowego, z dala od mięśnia łzowego. W ten sposób zmniejszasz ryzyko przedostania się kropli do dróg łzowych !



Zamknij powieki na 2 minuty i nie mrugaj (podczas mrugania lek może przedostać się do nosa, następnie przez bogato ukrwioną błonę śluzową bezpośrednio do krwioobiegu i działając jak zastrzyk dożylny – rozprzestrzeń się po całym organizmie).

Uciskaj delikatnie palcem okolice dolnego kanalika i woreczka łzowego przez 2 minuty. Nie uciskaj oka! Uciśnięcie oka może spowodować groźne w skutkach zwolnienie akcji serca (odruch oczno-sercowy).

Przy jednoczesnym stosowaniu kilku leków, kolejny lek należy wkraplać nie wcześniej niż po 10 minutach.

U małych dzieci lek powinno wkraplać się przy pochyleniu główki w kierunku skroniowym, by nadmiar leku wypłynął. Po podaniu leku uciśnij na okolice dolnego kanalika i woreczka łzowego. Nie uciskaj oka!

Prosimy o stosowanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza.